




Malaria Diagnosis and Treatment Chart औलो निदान तथा उपचार तालिका



ACT (Artemether + Lumefantrine) चक्की ३ दिन सम्म खुवाउने ।

Primaquine (PQ) चक्की 0.25 mg/kg bw को दरले १ दिन (पहिलो दिन) मात्र खुवाउने । ६ महिनाभन्दा कम उमेरका बालबालिका तथा उनीहरुलाई स्तनपान गराउने महिलाका साथै गर्भवती महिलाहरुलाई नखुवाउने ।

दिन	औषधी	उमेर (वर्षमा)				
		६ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कम	१ देखि ४ वर्षसम्म	५ देखि ९ वर्षसम्म	१० देखि १४ वर्षसम्म	१४ वर्ष माथी
१	CQ 150 mg चक्की	१/३ चक्की	१ चक्की	२ चक्की	३ चक्की	४ चक्की
	PQ 7.5 mg चक्की	१/३ चक्की वा 2.5 mg	१/३ चक्की	१ चक्की	१ १/३ चक्की	२ चक्की
२	CQ 150 mg चक्की	१/३ चक्की	१ चक्की	२ चक्की	३ चक्की	४ चक्की
	PQ 7.5 mg चक्की	१/३ चक्की वा 2.5 mg	१/३ चक्की	१ चक्की	१ १/३ चक्की	२ चक्की
३	CQ 150 mg चक्की	१/३ चक्की	१ चक्की	१ चक्की	१ १/३ चक्की	२ चक्की
	PQ 7.5 mg चक्की	१/३ चक्की वा 2.5 mg	१/३ चक्की	१ चक्की	१ १/३ चक्की	२ चक्की
४-१४	PQ 7.5 mg चक्की	१/३ चक्की वा 2.5 mg	१/३ चक्की	१ चक्की	१ १/३ चक्की	२ चक्की

तौल (के.जी.मा)	उमेर (वर्षमा)	पहिलो दिन		दोस्रो दिन		तेस्रो दिन		
		ACT		ACT		ACT		
		पहिलो मात्रा	८ घण्टा पछि	पहिलो मात्रा	विहान	राती	विहान	राती
१५ के.जी. भन्दा कम	३ वर्षभन्दा कम	१ चक्की	१ चक्की	१/३ चक्की	१ चक्की	१ चक्की	१ चक्की	१ चक्की
१५ देखि २५ के.जी.	३ देखि ९ वर्ष	२ चक्की	२ चक्की	१ चक्की	२ चक्की	२ चक्की	२ चक्की	२ चक्की
२६ देखि ३५ के.जी.	१० देखि १४ वर्ष	३ चक्की	३ चक्की	१ १/३ चक्की	३ चक्की	३ चक्की	३ चक्की	३ चक्की
३५ के.जी. माथी	१४ वर्ष माथी	४ चक्की	४ चक्की	२ चक्की	४ चक्की	४ चक्की	४ चक्की	४ चक्की

Supported By



पूर्व प्रेषण उपचार: यदि बिरामीलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नु पर्ने भएमा एक मात्र **IM Artesunate** दिएपछि मात्र प्रेषण गर्ने ।